

中學部家長通知

(中東呼吸綜合徵的注意事項)

敬啟者：

「中東呼吸症候群冠狀病毒感染症」(MERS-CoV)在韓國和中東地區爆發，該症死亡率可高達 36%，現時還沒有特效藥或預防疫苗，其症狀為發燒、咳嗽、呼吸急促與呼吸困難等，與一般流行性感冒相似，不容易區分。潛伏期為 2-14 天。

由於澳門是國際旅遊中心，訪客眾多，在國際傳染病爆發事件中不能獨善其身。我校應澳門疾病預防控制中心作以下呼籲：

1.家長密切留意子女，若子女在 2-14 天內有外遊史/接觸史並出現上述症狀，須儘快安排他們徒步往仁伯爵綜合醫院(山頂醫院)急診科就診，切勿乘坐公共交通工具。

2.由於傳播途徑以飛沫傳播為主，請家長必須教導子女培養良好個人衛生習慣的重要，鼓勵他們咳嗽或打噴嚏時用紙巾遮掩口鼻、將用過的紙巾掉進廁所和沖掉、經常以肥皂和水洗手 15 至 20 秒，或以酒精為主要成分的消毒洗手液洗手。


* 若有疑問，請在辦公時間內致電 28470388(內線 154)與校醫何醫生聯絡

* 或致電 28700800 與澳門疾病預防控制中心聯絡。

此致

澳門浸信中學家長

備註編號：14/15-S021



澳門浸信中學
中學部教務處

2015 年 6 月 23 日

中學部家長通知

(中東呼吸綜合徵的注意事項)

敬啟者：

「中東呼吸症候群冠狀病毒感染症」(MERS-CoV)在韓國和中東地區爆發，該症死亡率可高達 36%，現時還沒有特效藥或預防疫苗，其症狀為發燒、咳嗽、呼吸急促與呼吸困難等，與一般流行性感冒相似，不容易區分。潛伏期為 2-14 天。

由於澳門是國際旅遊中心，訪客眾多，在國際傳染病爆發事件中不能獨善其身。我校應澳門疾病預防控制中心作以下呼籲：

1.家長密切留意子女，若子女在 2-14 天內有外遊史/接觸史並出現上述症狀，須儘快安排他們徒步往仁伯爵綜合醫院(山頂醫院)急診科就診，切勿乘坐公共交通工具。

2.由於傳播途徑以飛沫傳播為主，請家長必須教導子女培養良好個人衛生習慣的重要，鼓勵他們咳嗽或打噴嚏時用紙巾遮掩口鼻、將用過的紙巾掉進廁所和沖掉、經常以肥皂和水洗手 15 至 20 秒，或以酒精為主要成分的消毒洗手液洗手。

* 若有疑問，請在辦公時間內致電 28470388(內線 154)與校醫何醫生聯絡

* 或致電 28700800 與澳門疾病預防控制中心聯絡。

此致

澳門浸信中學家長

備註編號：14/15-S021



澳門浸信中學
中學部教務處

2015 年 6 月 23 日